

Paciento kortelė metotreksatui: gydymo vaistu klaidos

Per burną vartojamų vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra metotreksato, pagal kurių bent vieną indikaciją vaistinį preparatą reikia vartoti kartą per savaitę.

ŠI PACIENTO KORTELĖ SKIRTA TIK PACIENTAMS, VARTOJANTIEMS VAISTINĮ PREPARATĄ, KURIO SUDĖTYJE YRA METOTREKSATO, NUO ARTRITO IR PSORIAZĖS.

JEIGU VARTOJATE METOTREKSATĄ VIENAI IŠ ANKSČIAU NURODYTŲ INDIKACIJŲ, BŪTINA VARTOTI METOTREKSATĄ TIK KARTĄ PER SAVAITĘ

Pilnai (visu žodžiu) įrašykite vartojimui skirtą savaitės dieną: _____

Nevartokite didesnės, nei paskirta dozė.

Perdozavimas gali sukelti sunkų ir net mirtiną nepageidaujamą poveikį. Perdozavimas pasireiškia tokiais simptomais, kaip ryklės skausmas, karščiavimas, burnos opos, viduriavimas, vėmimas, odos išbėrimas, kraujavimas arba neįprastas silpnumas. Jeigu manote, kad pavartojote daugiau nei skirta dozė, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Visada parodykite šią kortelę sveikatos priežiūros specialistams, nežinantiems apie Jūsų gydymą metotreksatu, kad išpētumėte juos apie tai, jog vaistą vartojate kartą per savaitę (pvz., patekus į ligoninę, pasikeitus sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui).

Daugiau informacijos rasite pacientui skirtame pakuotės lapelyje.